

## Schema consigliato di premedicazione all'esecuzione di esame radiologico con mezzo di contrasto per soggetti "allergici"

S.C: Radiodiagnostica  
Direttore: dott. G.A. Rollandi

La premedicazione è indicata in Pazienti con asma e gravi allergie che richiedono terapia; il rischio di reazione avversa non è tuttavia completamente eliminato. In caso di precedenti reazioni avverse al mezzo di contrasto il caso deve essere preventivamente discusso con il Medico Radiologo, che valuterà, in relazione al grado di reazione avversa, la necessità o meno all'impiego del mezzo di contrasto stesso e/o l'utilizzo di metodiche diagnostiche alternative.

### **Circa 12 ore prima dell'esame:**

- 8 cpr (32mg) per os di Urbason (confezione di 10 cpr da 4mg)
- oppure
- 5 cpr (25mg) per os di Deltacortene (confezione di 10 cpr da 5mg)

### **Circa 2 ore prima dell'esame:**

- 8 cpr (32mg) per os di Urbason (confezione di 10 cpr da 4mg)
- oppure
- 5 cpr (25mg) per os di Deltacortene (confezione di 10 cpr da 5mg)

### **Circa 6 ore dopo l'esame:**

- 4 cpr (16mg) di Urbason per os (confezione di 10 cpr da 4mg)
- oppure
- 2 cpr (10mg) per os di Deltacortene (confezione di 10 cpr da 5mg)

**Farmaci antistaminici anti H1** (es. Zyrtec, 1 cpr da 10 mg per os una volta al giorno, in accordo con la funzionalità epatica e renale) possono essere impiegati in associazione con i corticosteroidi.

**Nota Bene:** è sempre necessario consultare il Medico Curante per escludere eventuali controindicazioni allo schema di premedicazione suggerito e per modulare la posologia in rapporto al grado di "allergia" del Paziente.